Akademia Tyreologii Praktycznej

V EDYCJA

ZAPROSZENIE

Zachodniopomorski Oddział Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
oraz firma Merck mają przyjemność zaprosić na

warsztaty, które odbędą się
dn. 06.04.2019 r. (sobota)
w Hotelu Radisson Blu
Plac Rodła 10 w Szczecinie
w godzinach 09:00 - 13:30
w ramach V edycji programu Akademii Tyreologii Praktycznej

Wykłady poprowadzą:

dr n. med. Wiesława Fabian
prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz
dr n. med. Elżbieta Andrysiak-Mamos
dr n. med. Piotr Gościniak

Program edukacyjny ATP 2019 pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego

PTE

MERCK

Akademia Tyreologii Praktycznej

V EDYCJA

08:30 – 09:00 **Rejestracja uczestników i odbiór materiałów**

09:00 - 09:10 **Informacje o działalności Kolegium Lekarzy Rodzinnych**
Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału KLRwP - dr Wiesława Fabian

09:10 – 09:40 **Nadczynność tarczycy:**

- kiedy podejrzewać,
- jak diagnozować w gabinecie Lekarza Rodzinnego,
- jak rozpocząć leczenie,
- w jakim celu skierować do endokrynologa,
- jak długo kontynuować leczenie tyreostatykami po wyrównaniu nadczynności?

09:40 – 10:25 **Niedoczynność tarczycy a hormony płciowe – funkcja tarczycy w okresie pokwitania, prokreacji i przekwitania.**

10:25 – 11:10 **Kiedy lekarz rodzinny może podejrzewać choroby endokrynologiczne i jak prowadzić wstępną diagnostykę, w jakim trybie kierować do endokrynologa w zakresie chorób nadnerczy.**

11:10 - 11:25 **Przerwa kawowa**

11:25 - 11:55 **Skok ciśnienia tętniczego w gabinecie Lekarza Rodzinnego**
- jak leczyć doraźnie, jaką wdrożyć diagnostykę, a na co zwrócić uwagę, kiedy skierować do szpitala.

11:55 – 12:25 **Jak śniadanie spożywane w porze obiadu koreluje z rozwojem cukrzycy typu 2.?**

12:25 – 13:10 **Sesja pytań do Ekspertów**

1. R73 – stan czy choroba, leczyć czy nie?
2. Kiedy dla kogo i dlaczego należy stosować długo działającą metforminę?
3. Ile metforminy należy podawać pacjentom w stanie wyrównanej cukrzycy?
4. Czy stopień nasilenia niedoczynności tarczycy - niedoczynność subkliniczna i jawna - wpływa na dawkę jodu zalecaną do stosowania w postaci suplementu podczas ciąży?
5. Jakie powinno być postępowanie u osób w wieku >75 lat z utrzymującą się subkliniczną nadczynnością tarczycy?

I WIELE INNYCH

13:10 - 13:25 **Prezentacja produktowa**

13:25 **Poczęstunek**

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 05.04.2019:
Anna Kowalska, tel. 662 183 030,
Magda Graczykowska, tel. 734 414 707.

MERCK

PL/EUT/1118/0034/04122018